

Índice: Cálculo de áreas. Ejemplos. Problemas.

1.- Cálculo de áreas


Si f y g son dos funciones continuas en el intervalo $[a,b]$ tales que $f \geq g$, entonces el área de la región del plano limitada por sus gráficas y las rectas $x=a$ y $x=b$ viene dada por la fórmula:

$$S = \int_a^b (f-g)$$

Veamos primero que la fórmula es cierta cuando ambas funciones son no negativas.

Evidentemente:


$$S = S_1 - S_2 \stackrel{1}{=} \int_a^b f - \int_a^b g \stackrel{2}{=} \int_a^b (f-g)$$



Veamos ahora que también es cierta la fórmula en los demás casos.

Si la región del plano limitada por las gráficas de f y g no se encontrase situada por encima del eje de abscisas, como aparece en el siguiente dibujo, podríamos trasladar verticalmente dicha región hasta que lo estuviese.

Si $F(x) = f(x) + k$ y $G(x) = g(x) + k$, esto es, si las gráficas de F y G se han obtenido trasladando verticalmente hacia arriba las de f y g , respectivamente, una distancia k , es evidente que el área encerrada por las gráficas de F y G es la misma que la que encierran las de f y g . Por tanto:



$$S \stackrel{3}{=} \int_a^b (F-G) = \int_a^b ([f+k] - [g+k]) = \int_a^b (f+k-g-k) = \int_a^b (f-g)$$

En el caso de que las funciones f y g tengan puntos de corte en el intervalo $[a,b]$, se hallan dichos puntos y se estudia la posición relativa de las funciones en cada uno de los subintervalos en que esos puntos de corte dividen al intervalo $[a,b]$; allí donde $f > g$, se

¹ Por el significado geométrico de la integral definida de una función continua y no negativa en $[a,b]$, visto en la lección I-2.


² Por la propiedad de linealidad de la integral definida.

³ Ya que F y G son funciones continuas y no negativas en $[a,b]$ tales que $F \geq G$.

toma la integral de $f-g$ con signo positivo (o la de $g-f$ con signo negativo) y donde $g>f$, la de $g-f$ con signo positivo (o la de $f-g$ con signo negativo).

Si c es, por ejemplo, el único punto de corte, el área señalada es:

$$S=S_1+S_2 \stackrel{1}{=} \int_a^c (f-g) + \int_c^b (g-f)$$



* * *

Si se quiere evitar el estudio de la posición relativa de las funciones f y g en cada uno de los subintervalos, puede utilizarse la fórmula equivalente:


$$S = \left| \int_a^c (f-g) \right| + \left| \int_c^b (f-g) \right|$$

En efecto:

$$\begin{aligned} \int_a^c (f-g) + \int_c^b (g-f) &\stackrel{2}{=} \left| \int_a^c (f-g) \right| + \left| \int_c^b (g-f) \right| \stackrel{3}{=} \left| \int_a^c (f-g) \right| + \left| -\int_c^b (f-g) \right| \stackrel{4}{=} \\ &= \left| \int_a^c (f-g) \right| + \left| \int_c^b (f-g) \right| \end{aligned}$$

* * *

Observa que las fórmulas anteriores también se pueden aplicar al área limitada por la gráfica de una función continua en $[a,b]$, el eje de abscisas y las rectas $x=a$ y $x=b$, pues en este caso la segunda función es $g(x)=0$:



$$S=S_1+S_2 \stackrel{5}{=} \int_a^c f - \int_c^b f \stackrel{3}{=} \int_a^c (f-0) + \int_c^b (0-f)$$

2.- Ejemplos

Calculemos el área de la región del plano limitada por la gráfica de la función $y=\text{sen } x$, el eje de abscisas y las rectas $x=-\pi/2$ y $x=\pi/2$.

¹ Si se desea que la función integrando sea la misma, la fórmula, por la propiedad de linealidad de la integral definida, puede escribirse así:

$$s = \int_a^c (f-g) - \int_c^b (f-g)$$

² Ya que un número no negativo coincide con su valor absoluto.

³ Por la propiedad de linealidad de la integral definida.

⁴ Ya que dos números opuestos tienen el mismo valor absoluto.

⁵ Por el significado geométrico de la integral definida de una función continua en $[a,b]$, visto en la lección I-3.

1°) Resolvemos el sistema que forman las funciones que limitan por arriba y por abajo el recinto cuya área queremos hallar:

$$\begin{cases} y = \sin x \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \sin x = 0 \Rightarrow x = 0 + k\pi \xrightarrow{1} x = 0$$

2°) Averiguamos entre $-\pi/2$ y 0 y entre 0 y $\pi/2$ qué función está por encima y qué función está por debajo:²

x	Y ₁	Y ₂
$-\pi/4$	$-\sqrt{2}/2$	0
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	0

3°) Hallamos el área:³

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\pi/2}^0 (0 - \sin x) \cdot dx + \int_0^{\pi/2} (\sin x - 0) \cdot dx \stackrel{4}{=} -\int_{-\pi/2}^0 \sin x \cdot dx + \int_0^{\pi/2} \sin x \cdot dx \stackrel{5}{=} \\ &= [\cos x]_{-\pi/2}^0 + [-\cos x]_0^{\pi/2} = [\cos 0 - \cos(-\pi/2)] + [-\cos(\pi/2) + \cos 0] = \\ &= (1 - 0) + (-0 + 1) = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

* * *

Calculemos el área de la región del plano limitada por las gráficas de las funciones $y = x^3 - 2x + 1$ e $y = x^2 + 1$.

1°) Resolvemos el sistema que forman las funciones que limitan por arriba y por abajo el recinto cuya área queremos hallar:

$$\begin{cases} y = x^3 - 2x + 1 \\ y = x^2 + 1 \end{cases} \Rightarrow x^3 - 2x + 1 = x^2 + 1 \Rightarrow x^3 - 2x + 1 - x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^3 - x^2 - 2x = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x(x^2 - x - 2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -1 \end{cases} \end{cases}$$

2°) Averiguamos entre -1 y 0 y entre 0 y 2 qué función está por encima y qué función está por debajo:

x	Y ₁	Y ₂
$-1/2$	$15/8$	$10/8$
1	0	2

3°) Hallamos el área:

$$A = \int_{-1}^0 [(x^3 - 2x + 1) - (x^2 + 1)] \cdot dx + \int_0^2 [(x^2 + 1) - (x^3 - 2x + 1)] \cdot dx =$$

¹ Sólo interesan las soluciones que se encuentran en el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$.

² Estos dos pasos sobran si se tiene dibujado con precisión el recinto cuya área queremos calcular.

³ Si se repara en la simetría que presenta la función (se trata de una función impar), puede reducirse el cálculo al intervalo $[0, \pi/2]$ y multiplicar el resultado por 2.

⁴ Por la propiedad de linealidad de la integral definida.


⁵ La correspondiente integral indefinida es inmediata de tipo coseno.

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) \cdot dx + \int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x) \cdot dx \stackrel{1}{=} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^2 \\
&= \left[0 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right) \right] + \left[\left(-4 + \frac{8}{3} + 4 \right) - 0 \right] = -\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + 1 + \frac{8}{3} = \frac{-3-4+12+32}{12} = \frac{37}{12}
\end{aligned}$$

* * *

Calculemos el área de la región del plano limitada por la gráfica de la función $y=x^2$ y las rectas $y=2x$ e $y=x+2$.

Al representar las gráficas de las tres funciones² observamos que la región que definen puede dividirse en dos: la comprendida entre -1 y 0 , en la que $y=x+2$ es la función que se encuentra por encima e $y=x^2$ la que se encuentra por debajo; y la comprendida entre 0 y 2 , en la que $y=x+2$ está por encima e $y=2x$, por debajo.



Por tanto

$$\begin{aligned}
A &= \int_{-1}^0 (x+2-x^2) \cdot dx + \int_0^2 (x+2-2x) \cdot dx = \int_{-1}^0 (2+x-x^2) \cdot dx + \int_0^2 (2-x) \cdot dx \stackrel{1}{=} \\
&= \left[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^0 + \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \left[0 - \left(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \right] + [(4-2) - 0] = \\
&= 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 2 = \frac{12-3-2+12}{6} = \frac{19}{6}
\end{aligned}$$

3.- Problemas

1) Calcula el área de los recintos limitados por las siguientes líneas:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a) $y=2x, y=0, x=2, x=4$ | b) $y=x^2, y=x$ |
| c) $y=x^2-4x, y=2x-5$ | d) $y=x^3-6x^2+8x, OX$ |
| e) $y=x^3, OX, x=0, x=2$ | f) $y=2\sqrt{x}, y=x$ |
| g) $y=-x^2, y=-1$ | h) $y=x^4-5x^2+4, OX$ |
| i) $y=\cos x, OX, x=0, x=2\pi$ | j) $y=\ln x, y=0, x=e$ |
| k) $y=\sqrt{2x+1}, OX, x=0, x=4$ | l) $y=e^x(x^2+1), OX, x=0, x=1$ |
| m) $y=x^4-2x^2, y=2x^2$ | n) $y=\text{sen } x, y=\text{cos } x, x=0, x=\pi/2$ |
| ñ) $y=e^x, y=e^{-x}, OX, x=-1, x=1$ | o) $y=x(x-1)(x-2), OX$ |
| p) $x \cdot y=36, OX, x=6, x=24$ | q) $f(x)= x , g(x)=2x^2-1$ |
| r) $y=1/x, 2x+3y-7=0$ | s) $f(x)=x^2-2x, g(x)=6x-x^2$ |

¹ Las correspondientes integrales indefinidas son inmediatas de tipo potencial.

² Siempre es conveniente dibujar el recinto cuya área se pide calcular, pero cuando dicho recinto está limitado por más de dos funciones es necesario hacerlo.

- 2) Halla el área del triángulo mixtilíneo formado por la gráfica de la parábola $y^2=6x$ y sus tangentes en los puntos de corte con la recta $x=6$.
- 3) Calcula el área comprendida entre la parábola $y=-x^2+4x$ y sus tangentes en los puntos de intersección con el eje OX.
- 4) Halla el área del recinto limitado por la curva $y=x \cdot e^x$, el eje OX y la recta paralela al eje de ordenadas que pasa por el punto mínimo de la curva.
- 5) Calcula el área comprendida entre la curva $y=2x+1+1/x^2$, su asíntota oblicua y las rectas $x=1$ y $x=2$.
- 6) Halla el área de la región del plano limitada por la curva de ecuación $y=x^4-6x^2+5$, el eje OX y las rectas paralelas al eje de ordenadas que pasan por sus puntos de inflexión.
- 7) Las tangentes a la curva $y=x^3$ en los puntos A y B de abscisas 1 y 2, respectivamente, se cortan en el punto C. Determina el área del triángulo mixtilíneo ABC.
- 8) Halla el área del recinto limitado por las curvas de ecuaciones $y=e^x$, $y=e^{-x}$, $y=-e^x$, $y=-e^{-x}$ y las rectas $x=-1$ y $x=1$.
- 9) Se tiene un cuadrado determinado por los ejes coordenados y el vértice $(1,1)$. La curva $y=x^3$ lo divide en dos regiones. Halla la razón de las áreas de esas dos regiones.
- 10) Dada la recta $y=mx$, determina el valor de m para que el área del recinto limitado por dicha recta y la curva
- a) $y=x^2$ valga 36 b) $y=x^3$ valga 8
- 11) Un río tiene por ecuación $y=x^3/4-x^2+x$ respecto de un sistema en el que el eje de abscisas es un camino. Tomando como unidad el km y sabiendo que el precio del terreno es de 2,5 €/m², calcula el valor de la porción de terreno comprendida entre el río y el camino.
- 12) Dada la función $f(x)=x(x-a)^2$, se pide: a) el valor de a para que presente un máximo en $x=1$; b) la gráfica de f ; c) el área de la región que define con el eje OX.
- 13) Halla, mediante una integral definida:
- a) El área de un rectángulo de base a y altura b .
- b) El área de un triángulo rectángulo de base a y altura b .
- c) El área de un trapecio rectángulo de altura h y bases b y B .
- d) El área del círculo de radio r .
- e) El área de la elipse de ecuación $x^2/a^2+y^2/b^2=1$.

14) Sea f una función continua en $[a,b]$ y R la región del plano limitada por la gráfica de f , el eje de abscisas y las rectas $x=a$ y $x=b$. El volumen del cuerpo de revolución engendrado por R al girar alrededor del eje de abscisas se obtiene con la fórmula $V=\pi \cdot \int_a^b f^2$. Teniendo esto en cuenta, calcula:

a) El volumen del cilindro de altura h y radio de la base r .

b) El volumen del cono de altura h y radio de la base r .

c) El volumen del tronco de cono de altura h y radios de las bases r y R .

d) El volumen de la esfera de radio r .

e) El volumen del elipsoide que resulta al girar alrededor del eje de abscisas la elipse de ecuación $x^2/a^2+y^2/b^2=1$.

15) El área de la superficie de revolución engendrada al girar alrededor del eje de abscisas la gráfica de una función f entre a y b viene dada por la fórmula $S=2\pi \cdot \int_a^b f \cdot \sqrt{1+f'^2}$. Teniendo esto en cuenta, halla:¹

a) El área del cilindro de altura h y radio de la base r .

b) El área del cono de altura h y radio de la base r .

c) El área del tronco de cono de altura h y radios de las bases r y R .

d) El área de la esfera de radio r .

16) La longitud de la gráfica de f entre $x=a$ y $x=b$ viene dada mediante la fórmula $L=\int_a^b \sqrt{1+f'^2}$. Teniendo esto en cuenta, calcula la longitud de la circunferencia.¹

17) Encuentra el área de la región del plano limitada por la gráfica de la función $f(x)=\cos x/\sqrt{1-\sin x}$, el eje de abscisas y las rectas $x=0$ y $x=\pi/2$.²

18) Calcula el área de la región del plano situada en el primer cuadrante y comprendida entre la función $f(x)=(2+\sin x)/e^x$ y su asíntota.

19) Halla el área de la región del plano que se encuentra situada entre la gráfica de la función $y=1/(x^2+9)$ y su asíntota.

¹ La función integrando debe ser continua en $[a,b]$.

² Observa que la función no está definida en $x=\pi/2$.